

Cochez un seul: ROUGEOLE RUBÉOLE SYNDROME/INFECTION RUBÉOLE CONGÉNITALE

IDENTIFICATION

Numéro du cas attribué par la province ou territoire		Service de santé, ville et 3 premiers caractères du code postal	
Date de naissance Si non disponible, indiquer l'AGE en années	AAAA-MM-JJ	Date signalé au service de santé	AAAA-MM-JJ
Sexe Si féminin, enceinte?	Féminin Oui Non	Masculin Inconnu	Date du début de l'enquête AAAA-MM-JJ

ANTÉCÉDENTS, EXPOSITION ET INFORMATION CLINIQUE

La période d'incubation pour la ROUGEOLE est de 7 à 21 jours avant le début de l'éruption; transmissible 4 jours avant et 4 jours après le début de l'éruption.		La période d'incubation pour la RUBÉOLE est de 14-21 jours avant le début de l'éruption; transmissible 7 jours avant et au moins 4 jours après le début de l'éruption.	
Date du début de l'éruption	AAAA-MM-JJ	Historique de la vaccination	Oui Non Inconnu
Maladie clinique et lien épidémiologique à un cas confirmé par les laboratoires	Oui Non	Date de la 1 ^{ère} dose	AAAA-MM-JJ
		Date de la 2 ^e dose	AAAA-MM-JJ
		Date de la 3 ^e dose	AAAA-MM-JJ
Hospitalisé Suite à la rougeole/rubéole ou complications de la maladie	Oui Non Inconnu	Associé à une éclosion	Oui Non Inconnu
Source:	à l'extérieur du Canada		
	OU au Canada, lié à un cas/chaîne importé		
	OU au Canada, lié à un cas/chaîne de source inconnue		
	OU de source inconnue		

Dans l'espace fourni ou sur un feuillet attaché :

- dresser la liste de tous les pays, dates de voyages et lieux d'exposition au cours de la période d'incubation et de transmission
- si nouveaux arrivés au Canada, noter le pays de naissance ainsi que l'année de l'immigration
- toute autre information laboratoire ou d'exposition

INFORMATION LABORATOIRE

Virus de la rougeole isolé	Oui Non Non fait	Virus de la rubéole isolé	Oui Non Non fait
Virus de la rougeole détecté	Oui Non Non fait	Virus de la rubéole détecté	Oui Non Non fait
Hausse/modifications importante de l'anticorps spécifique à la rougeole	Oui Non Non fait	Hausse/modifications importante de l'anticorps spécifique à la rubéole	Oui Non Non fait
Sérologie positive du IgM spécifique à la rougeole*	Oui Non Non fait	Sérologie positive du IgM spécifique à la rubéole*	Oui Non Non fait

* Les cas sans liens épidémiologiques à un cas confirmé en laboratoire et sans antécédent de voyage récent dans une région qui connaît une activité de la maladie doit être confirmé par les laboratoires à l'aide de l'isolation des virus ou la sérologie convalescente.

Tous les cas diagnostiqués au Canada, peu importe la citoyenneté, doivent être signalés à l'ASPC.

VEUILLEZ ENVOYER VOTRE FORMULAIRE PROVINCIAL/TERRITORIAL DÉTAILLÉ POUR LE SYNDROME/INFECTION DE RUBÉOLE CONGÉNITALE.